Up to 2 Month Control of Nuisance Pests

MONEY BACK GUARANTEE†

For Outdoor Use Around the Home Only

Spectracide®

ACRE PLUS

TRIAZICIDE®

INSECT KILLER

FOR LAWNS & LANDSCAPES

CONCENTRATE

Insecticida concentrado para césped y jardín

Treats Up To 64,000 Sq Ft

Kills Over 180 Pests On Contact

Protects Lawns, Vegetables, Flowers, Trees & Shrubs

Active Ingredient:
Gamma-Cyhalothrin..... 0.25%
Other Ingredients..... 99.75%

†For terms of guarantee, see back panel.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

Net 1 gal (128 fl oz/3.7 L)

17-14671

MIX WITH WATER™

Spectracide®

ACRE PLUS

TRIAZICIDE®

INSECT KILLER

FOR LAWNS & LANDSCAPES

CONCENTRATE *Insecticida concentrado para césped y jardín*

PRODUCT FACTS

WHAT IT DOES:
Kills grubs, ants, fleas, chinch bugs, mosquitoes, sod webworms, aphids, beetles, whiteflies, mites, deer ticks, Japanese beetles, European crane flies, fire ants and other listed insects

WHERE TO USE:
Outdoors

QUESTIONS & COMMENTS:
Call 1-800-917-5438 or visit our website at **www.spectracide.com**

†GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.
NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

Distributed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation
PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-237-8845
EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CN)
Circled letter is first letter of lot number.
17-14672 © 2012 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 71121 96203 4

ABRA AQUÍ ETIQUETA RESELLABLE **PEEL HERE** *RESEALABLE LABEL*

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not allow children or pets into the treated area until dry.

- Do not water the treated area to the point of runoff.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
  1. Treatment to soil or vegetation around structures
  2. Applications to lawns, turf and other vegetation
  3. Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

No permita que los niños ni las mascotas entren en la zona tratada hasta que se seque.

- No riegue la zona tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No realice aplicaciones durante lluvias.
- Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, salvo los siguientes usos permitidos:
  1. Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras
  2. Aplicaciones a céspedes y otra vegetación
  3. Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta un máximo de 3 pies de altura. Aparte de las aplicaciones a los cimientos de edificios, todas las aplicaciones en espacios exteriores a superficies impermeables como aceras, caminos de entrada de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en céspedes ubicados a una distancia de hasta 100 pies de un pantano costero o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

HOW TO MIX AND APPLY

STEP 1

Determine size of spraying job. For lawns and vegetables, measure the area to be sprayed. For trees, shrubs and flowers, apply as a thorough cover spray. Make applications when insects first appear. Applications should be repeated only as directed to maintain control.

STEP 2

Use a clean sprayer. Carefully measure and mix the amount of product and water as indicated in the directions. It is always a good idea to wear disposable gloves when handling pesticides. **Kitchen utensils such as measuring cups and measuring spoons should not be used for food purposes after use with pesticides.**

STEP 3

Spray as directed. Thorough coverage is important.

STEP 4

Flush sprayer with clean water after each use.

See directions for list of use sites, plants and insects controlled. Use the rate given in the directions for the type of insect you want to control on the site or plant you are spraying.

MEASUREMENT CONVERSIONS

1 Tbsp = 3 tsp, 1 fl oz = 6 tsp or 2 Tbsp, 6 fl oz = ¾ cup

1½ Tbsp in 3 gallons of water = 1½ tsp in 1 gallon of water

2 Tbsp in 3 gallons of water = 2 tsp in 1 gallon of water

NOTE: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

LAWNS

UNDERGROUND INSECTS/THATCH INFESTING INSECTS including blue grass billbug (adult), black turfgrass *Ataenius* (adult), chiggers, chinch bugs, white grubs (Japanese beetle, European chafer, southern chafer), dung beetle and hyperodes weevils (adult), European crane flies, and mole crickets (nymphs and young adults): Mix 0.5 fl oz (1 Tbsp) in 1 gallon of water to treat 125 sq ft or 4 fl oz in 8 gallons water to treat 1,000 sq ft. For subsurface insect control (mole crickets, grubs), water treated area with additional ¼ to ½ inch of water for optimum results. Do not apply more than seven (7) times per year per location.

SURFACE INSECTS including ants*, armyworms, cockroaches, crickets, cutworms, earwigs, fleas, lawn moths (sod webworms), millipedes, mosquitoes, Palmetto bugs, sowbugs, mites, spittlebugs and waterbugs: Thoroughly wet down grass a few hours before applying. Mix 0.5 fl oz (1 Tbsp) in 1 gallon of water to cover 250 sq ft or 2 fl oz (4 Tbsp) in 4 gallons of water to cover 1,000 sq ft of lawn. Delay additional watering or mowing for 24 hours after application for optimum control of surface insects. For heavy infestations or to kill **Lone Star ticks, brown dog ticks, American dog ticks and deer ticks (which may transmit Lyme Disease),** use rate can be increased to 3 fl oz/1,000 sq ft. Do not apply more than 14 (fourteen) times per year per location.

WHEN TO TREAT: Treat the following pests during the months indicated or when first noticed.

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
				Billbugs		Grubs					
		Dung beetle grubs									
			Hyperodes weevils								
Treat ants* and other insects when they first appear or you notice lawn damage.											

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance

ORNAMENTAL TREES, SHRUBS AND FLOWERS

For use on ornamental trees, shrubs and flowers such as, but not limited to:

Ageratum, Ash, Aster, Arborvitae, Arizona Cypress, Azaleas, Begonia, Birch, Boxwood, Box Elder, Camellias, Cherry (ornamental), Non-bearing Citrus, Chrysanthemums, Carnations, Coleus,

CÓMO MEZCLAR Y APLICAR

PASO 1

Determine la magnitud de la tarea de rocío. Para céspedes y hortalizas, mida el área que se va a rociar. En árboles, arbustos y flores, aplique como un rocío que cubra por completo. Realice aplicaciones en cuanto aparezcan los insectos por primera vez. Las aplicaciones solo se deben repetir como se indica para mantener el control.

PASO 2

Use un rociador limpio. Mida cuidadosamente y mezcle la cantidad de producto y de agua como se indica en las instrucciones. Es siempre recomendable usar guantes desechables al manipular pesticidas. **No deben utilizarse utensilios de cocina tales como tazas o cucharas para medir para preparar alimentos después de usarlos con pesticidas.**

PASO 3

Rocíe como se indica. Es importante que la cobertura sea completa.

PASO 4

Enjuague bien el rociador con agua limpia después de cada uso.

Consulte las instrucciones para obtener una lista de los lugares y las plantas donde se usa, así como de los insectos controlados. Use la dosis que se indica en las instrucciones para el tipo de insecto que desea controlar en el lugar o planta que va a rociar.

CONVERSIONES DE MEDIDAS

1 cda. sopera = 3 cdtas., 1 onza líquida = 6 cdtas. o 2 cdas. soperas, 6 onzas líquidas = ¾ taza

1½ cdas. soperas en 3 galones de agua = 1½ cdtas. en 1 galón de agua

2 cdas. soperas en 3 galones de agua = 2 cdtas. en 1 galón de agua

NOTA: Este producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en zonas donde el rocío pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar (en particular con revestimientos vinílicos), pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.

CÉSPEDES

INSECTOS SUBTERRÁNEOS/INSECTOS QUE INFECTAN EL QUINCHADO entre los que se incluyen gorgojos de pasto azul anual (adultos), escarabajo negro del césped del género *Ataenius* (adulto), ácaros de la cosecha (larvas), chinches, larvas blancas (escarabajo japonés, gusano blanco europeo, escarabajo marrón), escarabajo del estiércol y gorgojos del género hyperodes (adultos), típulas europeas y grillos topos (ninfas y adultos jóvenes): Mezcle 0.5 onzas líquidas (1 cda. sopera) en 1 galón de agua para tratar 125 pies cuadrados o 4 onzas líquidas en 8 galones de agua para tratar 1,000 pies cuadrados. Para el control de insectos subterráneos (grillos topos, larvas), riegue el área tratada con ¼ a ½ pulgada más de agua para obtener óptimos resultados. No lo aplique más de siete (7) veces por año por lugar.

INSECTOS DE SUPERFICIE entre los que se incluyen hormigas*, gusanos soldados, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, polillas del césped (orugas tejedoras del césped), milpiés, mosquitos, cucarachas de caño, cochinillas de la humedad, ácaros, cigarrillas y chinches de agua: Humedezca el pasto completamente rociando con agua algunas horas antes de la aplicación. Mezcle 0.5 onzas líquidas (1 cda. sopera) en 1 galón de agua para cubrir 250 pies cuadrados o 2 onzas líquidas (4 cdas. soperas) en 4 galones de agua para cubrir 1,000 pies cuadrados de césped. Para lograr el mejor control de los insectos de superficie no riegue más ni corte hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación. Para infestaciones severas o para matar **garrapatas estrella solitaria, garrapatas marrones del perro, garrapatas americanas del perro y garrapatas de los venados (que pueden transmitir la enfermedad de Lyme)** la dosis de uso se puede aumentar hasta 3 onzas líquidas/1,000 pies cuadrados. No lo aplique más de 14 (catorce) veces por año por lugar.

CUÁNDO APLICAR: Trate los siguientes insectos nocivos durante los meses indicados o cuando note su presencia por primera vez.

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				Gorgojos		Larvas					
		Larvas del escarabajo del estiércol									
			Gorgojos del género hyperodes								
Trate las hormigas* y otros insectos cuando éstos aparezcan por primera vez o cuando observe daños en el césped.											

*Argentina, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas

Common Ninebark, Conifers, Douglas Fir, Elm, English Ivy, Euonymus, Exacum, Weeping Fig, Fir, Gladioli, Gold Bells, Hawthorn, Holly, Honeysuckle, Hypoestes, Ivy, Juniper, Lilac, Locust, Maple, Marigold, Mimosa, Mock Orange, Nannyberry, Oak, Orchid, Palm, Pansy, Pea Shrub, Petunia, Philodendron, Pine, Ornamental Plum, Poinsettia, Poplar, Tulip Poplar, Rhododendron, Roses, Snapdragon, Snowberry, Spruce, Taxus, Willow and Zinnia.

To control ants*, armyworms, azalea caterpillar, aphids, bagworms, black vine weevil (adult), box elder bugs, budworms, California oakworm, cankerworms, cockroaches, crickets, cutworms, Eastern tent caterpillar, elm leaf beetles, European sawfly, fall webworm, flea beetles, forest tent caterpillar, gypsy moth larvae, Japanese beetles (adults), June beetles (adults), lace bugs, leaf-feeding caterpillars, leafhoppers, leafminers (adults), leaf rollers, leaf skeletonizers, midges, oleander moth larvae, pillbug, pine sawfly, pine shoot beetles, pinetip moths, plant bugs, root weevil, sawfly, scale insects (crawlers), spiders, spittlebugs, striped beetles, striped oakworm, thrips, tip moth and tussock moth larvae: Mix 0.25 fl oz (½ Tbsp) in 1 gallon of water.

To control broadmites, brown softscale, California redscale (crawler), clover mites, mealybugs, pineneedle scale (crawler), spider mites and whiteflies: Mix 0.5 fl oz (1 Tbsp) in 1 gallon of water.
*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance

USE TIPS

- For best results, apply early before insect populations are high.
- For scale control, treat entire plant, including stem, trunks and twigs.
- For bagworm control, apply when bagworm larvae begin to hatch.
- For best results, apply to both sides of plant leaves and all plant surfaces where insects are present.

VEGETABLES

Mix 0.5 fl oz (1 Tbsp) in 1 gallon of water and apply to 300 sq ft. Apply when insects appear or when damage occurs. Spray to wet all infested plant surfaces.

Do not apply more than five times per growing season to corn. For all other crops, do not apply more than nine times per growing season.

For use on Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavalo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard and Kohlrabi to control: **alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, southern cabbageworm, cutworm, cabbage webworm, diamondback moth, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, yellow-striped armyworm, corn earworm, flea beetle, Japanese beetle (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, including lygus bug, stink bug, meadow spittlebug, aphid, whitefly, thrips and spider mite.**

For use on Corn (sweet and pop) to control: **cutworm, western bean cutworm, corn earworm, green cloverworm, meadow spittlebug, tobacco budworm, European corn borer, southwestern corn borer, stalk borer, hop vine borer, armyworm, beet armyworm, western corn rootworm beetle (adult), northern corn rootworm beetle (adult), southern corn rootworm beetle (adult), Mexican corn rootworm beetle (adult), bean leaf beetle, cereal leaf beetle, Japanese beetle (adult), sap beetle (adult), stink bug, grasshopper, corn leaf aphid, English grain aphid, chinch bug and green bug.**

Sweet Corn only: southern armyworm, western bean cutworm, tarnished plant bug, aster leafhopper, aphid, spider mite and corn silkfly (adult).

For use on Lettuce (head and leaf) to control: **alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, cutworm, saltmarsh caterpillar, green cloverworm, diamondback moth, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, southern armyworm, corn earworm, tobacco budworm, European corn borer, flea beetle, Japanese beetle (adult), vegetable weevil (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, stink bug, meadow spittlebug, aphid, whitefly and spider mite.**

For use on Onion (bulb) and Garlic to control: **cutworm, seedcorn maggot (adult), onion maggot (adult), leafminer (adult), armyworm, onion thrips, tobacco thrips, western flower thrips, flower thrips, aphid, plant bug and stink bug.**

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y FLORES ORNAMENTALES

Para usar en árboles, arbustos y flores ornamentales como por ejemplo:
Agerato, fresno, aster, árbol de la vida, ciprés de Arizona, azaleas, begonia, abedul, boj, arce, camelias, cerezo (ornamental), cítricos sin fructificación, crisantemos, claveles, coleo, fisocarpo, coníferas, abeto douglas, olmo, hiedra inglesa, evónimo, violeta persa, ficus benjamina, abeto, gladiolos, narcisos de olor, espino, acebo, madreselva, hypoestes, hiedra, enebro, lirio, algarrobo, arce, caléndula, mimosa, Mock orange, viburno, roble, orquídea, palma, pensamiento, caragana, petunia, filodendro, pino, ciruelo ornamental, nochebuena, álamo blanco o negro, tulipanero, rododendro, rosas, boca de dragón, bolita de nieve, abeto, tejo, sauce y zinia.

Para controlar hormigas*, gusanos soldados, oruga de las azaleas, áfidos, gusanos del saco, gorgojos de los invernaderos (adultos), insectos del arce, gusanos de las yemas, oruga de California, orugas ulcerosas, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, gusanos tenderos del este, escarabajos de la hoja del olmo, defoliador de pinos, orugas tejedoras del otoño, crisomélidos, oruga del álamo temblón, larvas de polilla gitana, escarabajos japoneses (adultos), escarabajos de junio (adultos), chinches de encaje, orugas que se alimentan de hojas, saltarillas, gusanos minadores (adultos), enrolladores de hojas, defoliadores, jejenes, larvas de Syntomeida epilias, cochinilla, defoliador de pino, escarabajos de los brotes de pino, barrenador de los brotes del pino, chinches, gorgojos de la raíz, defoliador, cochinillas (etapa móvil), arañas, cigarrillas, escarabajos rayados, oruga rayada, trips, barrenador de los brotes y orugas peludas: Mezcle 0.25 onzas líquidas (½ cda. sopera) en 1 galón de agua.

Para controlar ácaros blancos, cochinillas blandas marrón, cochinilla roja de California (etapa móvil), ácaros de trébol, cochinillas harinosas, cochinilla blanca del pino (etapa móvil), ácaros tetraniquidos y moscas blancas: Mezcle 0.5 onzas líquidas (1 cda. sopera) en 1 galón de agua.
*Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas

CONSEJOS SOBRE EL USO

- Para obtener mejores resultados, aplique antes de que las poblaciones de insectos sean grandes.
- Para el control de las cochinillas, trate toda la planta, incluyendo el tallo, troncos y ramitas.
- Para el control de los gusanos del saco (bagworm), aplique cuando las larvas de los gusanos del saco comiencen a salir.
- Para obtener mejores resultados, aplique en ambos lados de las hojas y en todas las superficies de la planta donde haya insectos.

HORTALIZAS

Mezcle 0.5 onzas líquidas (1 cda. sopera) en 1 galón de agua y aplique a 300 pies cuadrados. Aplique cuando aparezcan los insectos o cuando ocurra daño. Rocíe para mojar todas las superficies de las plantas infestadas.

No aplique al maíz más de cinco veces por temporada de cultivo. Para todos los demás cultivos, no aplique más de nueve veces por temporada de cultivo.

Para usar en brócoli, coles de Bruselas, col, brócoli cavalo, coliflor, brócoli chino, col China, mostaza parda y colinabo para controlar: **gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, gusano sureño de la col, gusano cortador, oruga de la col, polilla de la col, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, gusano pirero, isoca del maíz, crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, incluyendo chinche lygus, chinche hedionda, cigarrilla espumadora, áfido, mosca blanca, trips y ácaros tetraniquidos.**

Para usar en maíz (dulce y para palomitas) para controlar: **gusano cortador, gusano cortador del frijol occidental, isoca del maíz, gusano verde del trébol, cigarrilla espumadora, gusano cogollero del tabaco, barrenador europeo del maíz, barrenador del maíz del suroeste, barrenador del tallo, barrenador (Hydraecia immanis), gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano de la raíz del maíz del oeste (adulto), gusano de la raíz del maíz del norte (adulto), gusano de la raíz del maíz del sur (adulto), gusano de la raíz del maíz de México (adulto), escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo de la hoja del cereal, escarabajo japonés (adulto), escarabajo (Carpophilus lugubris) (adulto), chinche hedionda, saltamontes, pulgón del maíz, pulgón de la espiga, chinche y chinche verde.**

Solamente en maíz dulce: gusano soldado sureño, gusano cortador del frijol occidental, insecto de planta deslustrado, cicadélidos, áfido, ácaros tetraniquidos y mosca del maíz (adulta).

Para usar en la lechuga (corazón y hojas) para controlar: **gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, gusano cortador, gusano peludo, gusano verde del trébol, polilla de la col, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, gusano soldado sureño, isoca del maíz, gusano cogollero del tabaco, barrenador europeo del maíz, crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), escarabajo de las verduras (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, chinche hedionda, cigarrilla espumadora, ápido, mosca blanca y ácaros tetraniquidos.**

For use on Tomato, Tomatillo, Peppers (bell and nonbell), Eggplant, Ground Cherry and Pepino to control: **cabbage looper, cutworm spp., hornworm, tomato fruitworm, tobacco budworm, tomato pinworm, beet armyworm, southern armyworm, yellow-striped armyworm, fall armyworm, European corn borer, leafminer, Colorado potato beetle, flea beetle, grasshopper, leafhopper, aphid, whitefly, meadow spittlebug, stink bug, plant bug, stalk borer, blister beetle, Japanese beetle (adult), vegetable weevil and cucumber beetle (adult).**

For use on Asparagus Beans, Snap Beans, Wax Beans, Black-eyed Peas, Garden Peas, Green Peas and Sugar Snap Peas to control: **cutworm spp., green cloverworm, imported cabbageworm, saltmarsh caterpillar, velvetleaf caterpillar, Mexican bean beetle, corn earworm, painted lady butterfly (larva), European corn borer, looper spp., western bean cutworm, armyworm, yellow-striped armyworm, western yellow-striped armyworm, bean leafskeletonizer, webworm spp., leaftier spp., alfalfa caterpillar, stalk borer, cucumber beetle (adult), corn rootworm beetle (adult), flea beetle (adult), blister beetle, bean leaf beetle, Japanese beetle (adult), leafhopper spp., fleas hopper spp., three-cornered alfalfa hopper, meadow spittle bug, stink bug spp., plant bug spp., grasshopper, thrips spp. and aphid spp.**

For use on Lettuce (head and leaf) to control: **alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, cutworm spp., saltmarsh caterpillar, green cloverworm, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, corn earworm, European corn borer, flea beetle spp., Japanese beetle (adult), vegetable beetle (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, stink bug and meadow spittlebug.**

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST	
VEGETABLES	**PHI**
Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavalo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard, Kohlrabi and Lettuce (head and leaf)	1
Tomato, Tomatillo, Peppers (bell and nonbell), Eggplant, Ground Cherry and Pepino	5
Onions (bulb) and Garlic	14
Corn (sweet and pop)	21
Asparagus Beans, Snap Beans, Wax Beans, Black-eyed Peas, Garden Peas, Green Peas and Sugar Snap Peas	7
Lettuce (leaf and head)	1
PHI = Pre-Harvest Interval	

FRUIT AND NUT TREES

Mix 0.5 fl.oz. (1 Tbsp) in 1 gallon of water and apply to 300 sq ft. Apply when insects appear or when damage occurs. Spray to wet all infested plant surfaces.

For fruit trees, do not apply more than nine times per year, and only apply five times after blooms have formed. For nut trees, do not apply more than six times per year, and only apply five times after blooms have formed.

For use on Apple, Crabapple, Loquat, Mayhaw, Oriental Pear, Pear and Quince to control: **leafhopper spp., codling moth, tufted apple budworm, Oriental fruit moth, lesser appleworm, green fruitworm, tent caterpillar spp., tentiform leaf miner spp., apple maggot (adult), pear sawfly, plum curculio, Japanese beetle, plant bug, stink bug, leafhopper, periodical cicada, apple aphid, rosy apple aphid, pear psylla and San Jose scale (on fruit only).**

For use on Apricot, Sweet Cherry, Tart Cherry, Nectarine, Peach, Plum (Chickasaw, Damson, Japanese), Plumcot and Prune to control: **leafroller spp., peach twig borer, Oriental fruit moth, peachtree borer spp., green fruitworm, tent caterpillar spp., American plum borer, cherry fruit fly spp. (adult), plum curculio, rose chafer, Japanese beetle, plant bug, stink bug, leafhopper spp., periodical cicada and black cherry aphid.**

For use on Almond, Beech Nut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Chinquapin, Filbert (Hazelnut), Hickory Nut, Macadamia Nut, Walnut (Black and English) and Pecan to control: **leafroller spp., navel**

Para usar en cebolla (bulbo) y ajo para controlar: **gusano cortador, gusano de la semilla del maíz (adulto), larva de mosca de la cebolla (adulta), gusano minador (adulto), gusano soldado, trips de la cebolla, trips del tabaco, trips occidental de las flores, trips de las flores, áfido, chinche y chinche hedionda.**

Para usar en tomate, tomatillo, chiles (incluyendo el pimiento morrón), berenjena, tomatillo rojo y pepino para controlar: **falso medidor de la col, especies de gusanos cortadores, gusano cornudo, gusano del fruto del tomate, gusano cogollero del tabaco, gusano alfiler, gusano soldado del betabel, gusano soldado sureño, gusano pirero, gusano cogollero, barrenador europeo del maíz, gusano minador, escarabajo de la papa de Colorado, crisomélidos, saltamontes, saltarilla, áfido, mosca blanca, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche, barrenador del tallo, escarabajo ampollador, escarabajo japonés (adulto), gorgojo de las hortalizas y escarabajo del pepino (adulto).**

Para usar en frijol alado, ejotes, ejotes amarillos, frijoles de carita, chícharos de jardín, chícharos verdes y chícharos dulces para controlar: **especies de gusanos cortadores, gusano verde del trébol, gusano importado de la col, gusano peludo, velvetleaf caterpillar, conchuela del frijol, isoca del maíz, larvas de Vanessa cardui, barrenador europeo del maíz, especies de orugas medidoras, gusano cortador del frijol occidental, gusano soldado, gusano pirero, gusano pirero del oeste, oruga defoliadora del frijol, especies de gusanos tejedores, especies de orugas defoliadoras, mariposita amarilla de la alfalfa, barrenador del tallo, escarabajo del pepino (adulto), gusano de la raíz del maíz (adulto), crisomélidos (adulto), escarabajo ampollador, escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo japonés (adulto), especies de saltarillas, especies del género Halticus, periquito tricornudo, cigarrilla espumadora, especies de chinches hediondas, especies de chinches, saltamontes, especies de trips y especies de áfidos.**

Para usar en la lechuga (corazón y hojas) para controlar: **gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, especies de gusanos cortadores, gusano peludo, gusano verde del trébol, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, isoca del maíz, barrenador europeo del maíz, especies de crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), escarabajo de las verduras (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, chinche hedionda y cigarrilla espumadora.**

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA	
HORTALIZAS	**IPC**
Brócoli, coles de bruselas, col, brócoli cavalo, coliflor, brócoli chino, col china, mostaza parda, colinabo y lechuga (hojas y corazón)	1
Tomate, tomatillo, chiles (incluyendo el pimiento morrón), berenjena, tomatillo rojo y pepino	5
Cebollas (bulbo) y ajo	14
Maíz (dulce y para palomitas)	21
Frijol alado, ejotes, ejotes amarillos, frijoles de carita, chícharos de jardín, chícharos verdes y chícharos dulces	7
Lechuga (hojas y corazón)	1
IPC = Intervalo previo a la cosecha	

ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES

Mezcle 0.5 onzas líquidas (1 cda. sopera) en 1 galón de agua y aplique a 300 pies cuadrados. Aplique cuando aparezcan los insectos o cuando ocurra daño. Rocíe para mojar todas las superficies de las plantas infestadas.

En árboles frutales, no aplique más de nueve veces por año, y aplique solo cinco veces después del florecimiento. En árboles de nueces, no aplique más de seis veces por año, y aplique solo cinco veces después del florecimiento.

Para usar en manzano, manzano silvestre, níspero, mayhaw, peral asiático, peral y membrillo para controlar: **especies de saltarillas, polilla del manzano, palomilla de las yemas del manzano, polilla oriental del duraznero, grapholita prunivora, gusano verde del fruto, especies de lagartas (gusanos tenderos), especies de minador punteado, mosca de la manzana (adulta), minador punteado, picudo de la ciruela, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, saltarilla, cigarras periódicas, áfido del manzano, áfido rosado del manzano, psílido del peral y cochinilla de San José (solo en frutos).**

Para usar en chabacano, cerezo dulce, cerezo agrio, nectarina, durazno, ciruelo (Chickasaw, Damson, Japonés), ciruela y ciruelas pasa para controlar: **especies de enrolladores de hojas, anarsia, polilla oriental del duraznero, especies de barrenadores del duraznero, gusano verde del fruto, especies de lagartas (gusanos tenderos), American plum**

orangeworm, codling moth, filbertworm, peach twig borer, walnut husk fly spp. (adult), ants, plant bug, stink bug, chinch bug, leaffooted bug, walnut aphid, hickory shuckworm, pecan casebearer spp., pecan weevil, pecan aphid spp., pecan spittlebug and pecan phylloxera spp.

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST	
FRUIT AND NUT TREES	**PHI**
Apple, Crabapple, Loquat, Mayhaw, Oriental Pear, Pear and Quince	21
Apricot, Sweet Cherry, Tart Cherry, Nectarine, Peach, Plum (Chickasaw, Damson, Japanese), Plumcot and Prune	14
Almond, Beech Nut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Chinquapin, Filbert (Hazelnut), Hickory Nut, Macadamia Nut, Walnut (Black and English) and Pecan	14
PHI = Pre-Harvest Interval	

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store in a cool, dry area away from heat or open flame. **If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.

FIRST AID

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

borer, especies de la mosca de la cereza (adulta), picudo de la ciruela, frailecillo, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, especies de saltarillas, cigarras periódicas y áfido negro del cerezo.

Para usar en almendra, nuez de haya, nuez de Brasil, nogal blanco, nuez de la India, castaña, chinquapin, avellana (hazelnut), nogal americano, macadamia, nogal (negro e inglés), y nuez pecan para controlar: **especies de enrolladores de hojas, gusano de la naranja, polilla del manzano, filbertworm, anarsia, especies de mosca de la nuez (adulta), hormigas, chinche, chinche hedionda, chinche, insecto occidental de la semilla de la conífera, áfido del nogal, hickory shuckworm, especies de barrenador de la nuez, picudo del nogal, especies de pulgones del nopal, pecan spittlebug y especies de filoxera del pacanero.**

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA	
ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES	**IPC**
Manzano, manzano silvestre, níspero, mayhaw, peral asiático, peral y membrillo	21
Chabacano, cerezo dulce, cerezo agrio, nectarina, durazno, ciruelo (chickasaw, damson, japonés), ciruela y ciruelas pasa	14
Almendra, nuez de haya, nuez de brasil, nogal blanco, nuez de la india, castaña, chinquapin, avellana (hazelnut), nogal americano, macadamia, nogal (negro e inglés) y nuez pecana	14
IPC = Intervalo previo a la cosecha	

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego. **Si está vacío:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni rellenar este envase. Ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es extremadamente tóxico para los peces. El arrastre y el escurrimiento pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas cercanas al sitio de aplicación. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe lluvia en las siguientes 24 horas asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a los residuos en los cultivos o las malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por la zona de tratamiento.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-237-8845 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CN)
Circled letter is first letter of lot number. 17-14672 © 2012 UIC